

Ordre: **Rongeurs** Famille: **Caviidés**

Caractéristiques:
Rongeur d'une vingtaine de cm, il est domestiqué depuis 3000 ans par les Incas.
Il existe plusieurs variétés de couleurs et de poils.

Mode de Vie:
Calm et sympathique, c'est un excellent rongeur de compagnie diurne et nocturne avec phase de repos. Il grimpe peu, vit en petites colonies.

Alimentation:
Herbivore strict, on donnera :
- des granulés spécifiques (20 % de protéines)
- vitamine C en permanence
- fruits, légumes, foin
- il pratique la coprophagie

Reproduction:
La saison sexuelle est continue, le cycle dure 15 à 17 jours.
La gestation est de 60 à 70 jours
2 à 3 petits par portée
Sevrage entre 2 à 4 semaines.

Répartition Géographique:
Amérique du Sud

Commentaires:

Nom Latin: **Cavia porcellus**

Nom Français: **Cochon d'Inde = cobaye**

Nom Anglais: **Guinea pig**

Ordre: **Rongeurs** Famille: **Chinchillidés**

Caractéristiques:
C'est un rongeur de taille moyenne (25 cm + 10 cm de queue environ), gris, blanc ou beige à poil très soyeux.

Mode de Vie:
Il est crépusculaire et nocturne mais s'adapte à la vie diurne en captivité. C'est un très bon grimpeur. Il vit en altitude (3000 à 4000 m) en colonies.

Alimentation:
Il est herbivore strict: foin, granulés pour Chinchilla (pellets) dosés à 18 % de protéines.

Reproduction:
De Novembre à Mai a lieu l'accouplement, les chaleurs durent environ 31 jours, la gestation 110 à 120 jours.
Les jeunes naissent yeux ouverts et pourvus de dents.
1 à 2 petits par portée et 2 portées par an sont possibles.
Sevrage vers 7 à 8 semaines.


Répartition Géographique:
Chili pour C. laniger
Chili, Pérou, Argentine pour C. brevicauda.

Commentaires:
En fait, le chinchilla actuellement domestiqué est un croisement entre C. laniger et C. brevicauda. Le chibakita à Pérou est...

Nom Latin: **Chinchilla laniger**

Nom Français: **Chinchilla**

Nom Anglais: **Chinchilla**



Fiche Précédente

Nom Latin
Annamemys annamensis

Nom Français
Tortue feuille

Nom Anglais
Annam leaf turtle

Ordre Chéloniens Famille Bataguridae

Caractéristiques
De petite taille (< 20 cm), avec une dossière brunâtre, elle possède 3 carènes peu développées. La tête et le cou, noirâtres, sont striés de bandes jaunes.

Mode de Vie
Aquatique, elle vit dans des plans d'eau calmes, rivières, marécages. Elle se confond avec la végétation aquatique.

Alimentation
Omnivore

Reproduction
Inconnue

Répartition Géographique
Centre du Vietnam

Commentaires
La localisation de cette espèce, très réduite et mal définie, son camouflage, rendent les connaissances difficiles.



Fiche Précédente

Nom Latin
Chameleo calyptratus

Nom Français
Caméléon casqué

Nom Anglais
Bony crested chameleon

Ordre Squamates Famille Chamaeleonidés

Caractéristiques
Ce caméléon est facilement reconnaissable à son long casque crânien. Le fond de sa robe est vert bleuté parsemé de taches orangées et jaunes. Il est de grande taille 50 - 60 cm.

Mode de Vie
Diurne et arboricole, il profite du soleil dans les arbustes. Il peuple les pentes des forêts humides des hauts plateaux de la péninsule arabique. 26 à 32°C pour une hygrométrie de 60 à 70% lui conviennent.

Alimentation
C'est un des rares caméléons à consommer en plus des insectes, végétaux (cresson, luzerne) ou fruits (mangue, fruits rouges).

Reproduction
La femelle peut pondre 30 à 80 oeufs 3 à 4 fois/an. Mature vers 3 - 4 mois, la femelle arrête la prise de nourriture peu de temps avant la ponte. Les oeufs seront incubés 150 à 220 jours à une température de 28°C environ.

Répartition Géographique
Arabie Saoudite, Yémen.

Commentaires
? [voir aussi](#) [Chameleo calyptratus calyptratus](#) et [Chameleo calyptratus calyptratus](#)



NAVIGATION

Ordre	Famille
Anoures	Dendrobatidés

Caractéristiques

Toutes les espèces de Dendrobates sont en annexe II de la Convention de Washington, il s'agit donc d'espèces protégées soumises à réglementation. Leur importation, contrôlée, ne peut se faire qu'avec un numéro de Cites. De plus un certain nombre d'espèces sont originaires de Guyane, département français, et ne peuvent donc pas être détenues en captivité en France suite à un arrêté de 1986 qui les protège sur le territoire. Dendrobates auratus est une espèce couramment reproduite en captivité, idéale pour débuter car elle est solide, prolifique, et d'un prix abordable. Généralement verte métallique et noire, sa coloration peut varier considérablement suivant son aire de répartition. Certains spécimens présentent un patron de coloration très différent de celui fréquemment rencontré, parfois bleu pâle et noir ou noir avec des petits points verts. La taille est comprise entre 2,5 et 4 cm, les mâles étant plus petits que les femelles.

Mode de Vie

Un terrarium de 60 x 50 x 40 cm convient pour loger un petit groupe de deux à quatre individus de Dendrobates auratus. Le sol, constitué de tourbe, doit être acide afin de limiter les risques de développement bactérien fréquent en milieu chaud et saturé d'humidité. Dendrobates auratus doit, en effet, être maintenue à un taux de 80 % d'hygrométrie pour une température de 26°C le jour et 22°C la nuit. L'intérieur du terrarium doit être abondamment planté et décoré afin de fournir à ses habitants

© 2008-2010 - Tous droits réservés. - [Retour à l'accueil](#)

Nom latin: **Dendrobates auratus**

Nom Français: **Dendrobates auratus**

Nom Anglais: **Green poison arrow frog**